

¿Cómo puedo protegerme?

Consejo #1: Use condones.

Los condones masculinos y femeninos previenen que la sífilis se propague al evitar el contacto directo con las llagas. Al tocar las llagas que no están cubiertas todavía pueden contagiar la sífilis.

Consejo #2: Evite el alcohol y las drogas.

El consumo de alcohol y uso de drogas puede llevar a relaciones sexuales sin protección. Evitando el alcohol y las drogas puede ayudar a prevenir la propagación de sífilis.

Consejo #3: Hable con su pareja(s) sexual.

No siempre es obvio que la pareja sexual tenga sífilis porque úlceras sifilíticas pueden estar ocultas. A menos que sepa que su pareja(s) sexual haya sido médicamente examinada y tratada, puede estar en riesgo.

Consejo #4: Hágase la prueba regularmente.

Si usted tiene más de una pareja sexual, hágase la prueba cada 6 meses. La sífilis es curable.

¿Dónde puedo ir si necesito condones gratis?

WWW.LACONDOM.COM

Condomes gratuitos se pueden enviar desde el sitio web a su casa. También puede recogerlos en casi 300 sitios en el condado de Los Ángeles.

¿A quién llamo si necesito más información?

**Condado de Los Ángeles,
Departamento de Salud Pública**

División de Programas de VIH y ETS

Teléfono: (213) 351-8000

www.publichealth.lacounty.gov/dhsp



Sífilis:

**Lo Que Hombres Que
Tienen Sexo con
Hombres (HSH)
Necesitan Saber**



¿Qué es la sífilis?

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por bacterias (gérmenes). Muchos de sus signos y síntomas son los mismos que otras enfermedades.

¿Cómo se contagia la sífilis?

La sífilis se transmite de persona a persona durante el sexo vaginal, anal u oral. También puede pasar a través del contacto piel a piel con una úlcera sifilítica. Las mujeres embarazadas con sífilis pueden también transmitir la enfermedad a su bebé durante el embarazo.

¿Cuáles son los signos de la sífilis?

La sífilis tiene diferentes etapas con diferentes signos. Muchas personas que tienen sífilis no muestran síntomas por años.

- **La sífilis primaria:** Una úlcera que no produce dolor, alrededor o dentro en el pene, la vagina, la boca o el ano que a veces dura 2-6 semanas y desaparece por sí mismo.
- **La sífilis secundaria:** Una erupción contagiosa puede aparecer en el cuerpo, las manos y

los pies. Estos síntomas pueden aparecer y desaparecer durante aproximadamente 1 año.

- **La sífilis latente:** Los síntomas generalmente desaparecen por sí solos y la persona ya no es contagiosa a las parejas sexuales.

¿Cómo se trata la sífilis?


La sífilis se trata y se cura fácilmente con antibióticos. Este medicamento se administra en forma de inyección. Asegúrese de que tanto usted como su pareja (s) sexual terminen el tratamiento antes de tener sexo de nuevo.

5 datos sobre la Sífilis en el Condado de Los Angeles

Obtenga más información y esté al tanto de su riesgo.

Dato #1: Cada año más personas tienen sífilis.

Dato #2: Casi 9 de cada 10 personas con sífilis son hombres que tienen sexo con hombres (HSH).



Dato #3: En el Condado de Los Ángeles, los HSH de color son los más afectados.

Dato #4: En el año 2012, más de la mitad de HSH en el Condado de Los Ángeles tenía una combinación de sífilis y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).



Dato #5: El riesgo de contraer el VIH es mayor para los HSH que tienen sífilis.

